

動物用藥品使用準則第三條附件一水產動物用藥品使用規範修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
一、品目： （一）安默西林Amoxicillin （二）安比西林Ampicillin （三）脫氧羥四環黴素Doxycycline （四）紅黴素Erythromycin <u>（五）丁香酚(Eugenol;又名丁香油Clove oil)</u> <u>（六）氟甲磺氯黴素Florfenicol</u> <u>（七）氟滅菌Flumequine</u> <u>（八）北里黴素Kitasamycin</u> <u>（九）林可黴素Lincomycin</u> <u>（十）歐索林酸Oxolinic acid</u> <u>（十一）羥四環黴素Oxytetracycline</u> <u>（十二）史黴素Spiramycin</u> <u>（十三）磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine</u> <u>（十四）磺胺一甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine</u> <u>（十五）甲磺氯黴素Thiamphenicol</u> <u>（十六）三氯仿Trichlorofon</u>	一、品目： （一）安默西林Amoxicillin （二）安比西林Ampicillin （三）脫氧羥四環黴素Doxycycline （四）紅黴素Erythromycin （五）氟甲磺氯黴素Florfenicol （六）氟滅菌Flumequine （七）北里黴素Kitasamycin （八）林可黴素Lincomycin （九）歐索林酸Oxolinic acid （十）羥四環黴素Oxytetracycline （十一）史黴素Spiramycin （十二）磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine （十三）磺胺一甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine （十四）甲磺氯黴素Thiamphenicol （十五）三氯仿Trichlorofon	一、因應水產養殖發展快速，各類水產動物種類繁多且持續新增，為符合水產動物藥品實際使用情形，新增品目「丁香酚 Eugenol」，爰增訂第五款。 二、配合新增第五款品目「丁香酚 Eugenol」，現行規定第五款至第十五款之款次依序遞移為第六款至第十六款。
二、本規範指定之對象水產動物如下： （一）鰻形目：例如鰻魚、胸鯉等。 （二）鮭形目：例如鱒魚、香魚等。 （三）鼠鱈目：例如虱目魚等。 （四）鯉形目：例如草魚、鯉魚、鯪魚、青魚、鯽魚、泥鰱、鮠魚、鯰魚、紅鮎魚、石鮒等。 （五）鯰目：例如鯰魚、塘虱魚等。 （六）鱸形目：例如金目鱸、七星鱸、鰱、鰱魚、花身雞魚、海鱺、黃臘鰱、紅甘鰱、青甘鰱、銀紋笛鯛、花軟厚石鱸、包公魚、青嘴龍占、嘉臘魚、黃錫鯛、黃鰭鯛、黑鯛、赤鯨、變身苦、金鐘、吳郭魚、烏魚、午仔、鸚哥魚、舌鰈虎魚、臭都魚、網紋臭都魚、鮪魚、白鯧、鱧魚等。 （七）鱒形目：例如鱒龍魚等。 （八）十足目：例如草蝦、白蝦、斑節蝦、淡水長臂大蝦等。 （九）龜鱉目：例如甲魚等。 （十）無尾目：例如牛蛙、虎皮蛙等。	二、本規範指定之對象水產動物如下： （一）鰻形目：例如鰻魚、胸鯉等。 （二）鮭形目：例如鱒魚、香魚等。 （三）鼠鱈目：例如虱目魚等。 （四）鯉形目：例如草魚、鯉魚、鯪魚、青魚、鯽魚、泥鰱、鮠魚、鯰魚、紅鮎魚、石鮒等。 （五）鯰目：例如鯰魚、塘虱魚等。 （六）鱸形目：例如金目鱸、七星鱸、鰱、鰱魚、花身雞魚、海鱺、黃臘鰱、紅甘鰱、青甘鰱、銀紋笛鯛、花軟厚石鱸、包公魚、青嘴龍占、嘉臘魚、黃錫鯛、黃鰭鯛、黑鯛、赤鯨、變身苦、金鐘、吳郭魚、烏魚、午仔、鸚哥魚、舌鰈虎魚、臭都魚、網紋臭都魚、鮪魚、白鯧、鱧魚等。 （七）鱒形目：例如鱒龍魚等。 （八）十足目：例如草蝦、白蝦、斑節蝦、淡水長臂大蝦等。 （九）龜鱉目：例如甲魚等。 （十）無尾目：例如牛蛙、虎皮蛙等。	本點未修正。
三、本規範所指之投藥途徑，「經口」係將指定之藥品，添加、混和或浸潤於水產飼料中或以其他方式經口投藥。「藥浴」係將指定之藥品，添加於養殖池或容器內之水中，以浸泡投藥。	三、本規範所指之投藥途徑，「經口」係將指定之藥品，添加、混和或浸潤於水產飼料中或以其他方式經口投藥。「藥浴」係將指定之藥品，添加於養殖池或容器內之水中，以浸泡投藥。	本點未修正。

四、本規範所指之投藥劑量，經口投藥者均以魚之體重為單位，以藥浴投藥者均以水量(ppm)為單位。抗生素之劑量均以力價表示。	四、本規範所指之投藥劑量，經口投藥者均以魚之體重為單位，以藥浴投藥者均以水量(ppm)為單位。抗生素之劑量均以力價表示。	本點未修正。																																								
五、本規範所定動物用藥品品目，應依據獸醫師(佐)處方藥品販賣及使用管理辦法及本規範規定使用。但用於生理代謝特殊或飼養於特殊水溫、鹽度環境之水產動物，獸醫師(佐)應依專業調整其用法、用量及停藥期，以確保水產動物安全並避免藥品殘留未符規定。 本規範所定動物用藥品品目之使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下： (一) 安默西林 Amoxicillin 化學名：α-Amino-p-hydroxybenzylpenicillin 性狀：白色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。本劑之理化性狀及藥理學特性，極近似安比西林。通常使用其三水合物（trihydrate）。 作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，魚病上主要使用於鏈球菌或發光桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用本劑偶會發生局部作用。 3、使用 Amoxicillin trihydrate。 <table><tr><th>對象水產動物</th><th>投藥途徑</th><th>劑量或濃度及用法</th><th>用途</th><th>停藥期（日）</th></tr><tr><td>鰻形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr><tr><td>鮭形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr><tr><td>鱸形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr></table> (二) 安比西林Ampicillin 化學名：α-Aminobenzylpenicillin 性狀：白色乃至淡黃色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。通常使用其三水合物。在水中不安定，故調配後立即投藥。 作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	鰻形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	鮭形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	鱸形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	五、本規範所定動物用藥品品目，應依據獸醫師(佐)處方藥品販賣及使用管理辦法及本規範規定使用。但用於生理代謝特殊或飼養於特殊水溫、鹽度環境之水產動物，獸醫師(佐)應依專業調整其用法、用量及停藥期，以確保水產動物安全並避免藥品殘留未符規定。 本規範所定動物用藥品品目之使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下： (一) 安默西林 Amoxicillin 化學名：α-Amino-p-hydroxybenzylpenicillin 性狀：白色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。本劑之理化性狀及藥理學特性，極近似安比西林。通常使用其三水合物（trihydrate）。 作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，魚病上主要使用於鏈球菌或發光桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用本劑偶會發生局部作用。 3、使用 Amoxicillin trihydrate。 <table><tr><th>對象水產動物</th><th>投藥途徑</th><th>劑量或濃度及用法</th><th>用途</th><th>停藥期（日）</th></tr><tr><td>鰻形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr><tr><td>鮭形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr><tr><td>鱸形目</td><td>經口</td><td>40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。</td><td>治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。</td><td>5</td></tr></table> (二) 安比西林Ampicillin 化學名：α-Aminobenzylpenicillin 性狀：白色乃至淡黃色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。通常使用其三水合物。在水中不安定，故調配後立即投藥。 作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	鰻形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	鮭形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	鱸形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5	一、因應水產養殖發展快速，各類水產動物種類繁多且持續新增，為符合水產動物藥品實際使用情形，新增品目「丁香酚 Eugenol」，爰增列第二項第五款。 二、配合增列第二項第五款，原款次依序遞移。
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）																																						
鰻形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						
鮭形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						
鱸形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）																																						
鰻形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						
鮭形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						
鱸形目	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5																																						

魚病上多用於鏈球菌或巴士德桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。

- 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用本劑偶會發生局部作用。
3、使用Ampicillin trihydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5
鱸形目	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5

（三）脫氧羥四環黴素Doxycycline

化學名： α -6-Deoxy-5-hydroxytetracycline monohydrate

性狀：為黃色至暗黃色結晶性粉末，無臭帶苦味。通常使用鹽酸鹽，鹽酸鹽易溶於水、甲醇，難溶於丙酮，不溶於乙醚、氯仿。乾燥狀態相當安定，水溶液於酸性安定，鹼性較不安定。

作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、陰性菌、螺旋體屬、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

- 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Doxycycline hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20

（四）紅黴素Erythromycin

化學名：Erythromycin A

性狀：為鹼性物質。白色至淡黃白色結晶、結晶性粉末或粉末，無臭帶苦味。難溶於水，易溶於酒精、丙酮、氯仿、乙醚等。畜牧獸醫及水產上除基質外，多用硫氰酸鹽（Thiocyanate）及乙基琥珀酸鹽（Ethylsuccinate）。

作用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、黴漿體、鈎端螺旋體、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。與其他巨環類抗生素之間有不完全的交叉抗

魚病上多用於鏈球菌或巴士德桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。

- 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用本劑偶會發生局部作用。
3、使用Ampicillin trihydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5
鱸形目	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。	5

（三）脫氧羥四環黴素Doxycycline

化學名： α -6-Deoxy-5-hydroxytetracycline monohydrate

性狀：為黃色至暗黃色結晶性粉末，無臭帶苦味。通常使用鹽酸鹽，鹽酸鹽易溶於水、甲醇，難溶於丙酮，不溶於乙醚、氯仿。乾燥狀態相當安定，水溶液於酸性安定，鹼性較不安定。

作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、陰性菌、螺旋體屬、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

- 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Doxycycline hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20

（四）紅黴素Erythromycin

化學名：Erythromycin A

性狀：為鹼性物質。白色至淡黃白色結晶、結晶性粉末或粉末，無臭帶苦味。難溶於水，易溶於酒精、丙酮、氯仿、乙醚等。畜牧獸醫及水產上除基質外，多用硫氰酸鹽（Thiocyanate）及乙基琥珀酸鹽（Ethylsuccinate）。

作用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、黴漿體、鈎端螺旋體、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。與其他巨環類抗生素之間有不完全的交叉抗

藥性。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Erythromycin或Erythromycin thiocyanate。					藥性。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Erythromycin或Erythromycin thiocyanate。				
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（海鰻除外）	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30	鱸形目（海鰻除外）	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
（五）丁香酚Eugenol(又名丁香油Clove oil) 化學名：1,3,4-Eugenol；4-Allyl-2-methoxyphenol 性狀：無色至淡黃色微稠液體，具丁香氣味。 作用：鎮靜及麻醉。 注意事項：1.魚浸泡後移回養殖水中。 2.鎮靜或麻醉程度常受魚之體重、水溫或水質的影響，應視實際情形在規定濃度範圍作適當調整。 3.藥浴期間應經常注意觀察魚體狀況，如有麻醉過深情況，應即迅速移回養殖水中。					（五）氟甲磺氯黴素Florfenicol 化學名：2,2-dichloro-N-[(αS,βR)-α-(fluoromethyl)-β-hydroxy-P-(methylsulfonyl)-phenethyl] acetamide 性狀：白色~淡黃色結晶性粉末或粉末，可溶於丙酮，稍溶於甲醇，不溶於水。 作用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、鏈球菌或發光桿菌感染之治療。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Florfenicol。				
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（限石斑魚）	短時間浸泡	5-20 ppm	鎮靜及麻醉	7	鰻形目	經口	10mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鰻敗血症假單胞菌之感染。	7
（六）氟甲磺氯黴素Florfenicol 化學名：2,2-dichloro-N-[(αS,βR)-α-(fluoromethyl)-β-hydroxy-P-(methylsulfonyl)-phenethyl] acetamide 性狀：白色~淡黃色結晶性粉末或粉末，可溶於丙酮，稍溶於甲醇，不溶於水。 作用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、鏈球菌或發光桿菌感染之治療。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Florfenicol。					鮭形目	經口	10mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌或鮭屬產氣單胞菌或親水性產氣單胞菌群之感染。	14
					鱸形目	經口	10mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鍊球菌或發光桿菌之感染。	15
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	鯉形目	經口	10mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光	5

鰻形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鰻敗血症假單胞菌之感染。	7
鮭形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性弧菌或鮭屬產氣單胞菌或親水性產氣單胞菌群之感染。	14
鱸形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鏈球菌或發光桿菌之感染。	15
鯉形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	5
鯰目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	5
鱒形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	15
鼠鱈目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鰻利斯頓氏菌(Listonella anguillarum)之感染	15

（七）氟滅菌Flumequine

化學名：6, 7-dihydro-9-fluoro-5-methyl-1-oxo (1H, 5H)-benzo (i, j) quinolizine-2-carboxylic acid

性狀：白色微細結晶性粉末，無臭而帶有微苦，不溶於水，溶於氯仿及乙醇。

作用：對於革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於發光桿菌、運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Flumequine。

			假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	
鯰目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	5
鱒形目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	15
鼠鱈目	經口	10mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鰻利斯頓氏菌(Listonella anguillarum)之感染	15

（六）氟滅菌Flumequine

化學名：6, 7-dihydro-9-fluoro-5-methyl-1-oxo (1H, 5H)-benzo (i, j) quinolizine-2-carboxylic acid

性狀：白色微細結晶性粉末，無臭而帶有微苦，不溶於水，溶於氯仿及乙醇。

作用：對於革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於發光桿菌、運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Flumequine。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目	經口	20mg/kg/日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	8
鰻形目	經口	20mg/kg/日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	20

（七）北里黴素Kitasamycin

化學名：Kitasamycin

性狀：屬於巨環類抗生素，為鹼性白色乃至黃色、無臭、帶苦味結晶性粉末。通常使用基質或酒石酸鹽。基質易溶於甲醇、乙醇、丁醇、丙酮、氯仿、乙醚及苯，不溶於酸性水，微溶於水。酒石酸鹽易溶於

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目	經口	20mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	8
鰻形目	經口	20mg／kg／日，連續投藥 3～5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	20

（八）北里黴素Kitasamycin

化學名：Kitasamycin

性狀：屬於巨環類抗生素，為鹼性白色乃至黃色、無臭、帶苦味結晶性粉末。通常使用基質或酒石酸鹽。基質易溶於甲醇、乙醇、丁醇、丙酮、氯仿、乙醚及苯，不溶於酸性水，微溶於水。酒石酸鹽易溶於水、乙醇、甲醇、丙酮，可溶於乙酸乙酯，微溶於氯仿、乙醚，難溶或不溶於石油醚、甲苯等。本劑相當安定。

作用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、鈎端螺旋體屬及黴漿體有抗菌作用，對革蘭陰性桿菌則無抗菌作用。與其他巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。魚病上主要使用於鏈球菌之感染。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Kitasamycin。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目	經口	80mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
鱸形目	經口	80mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20

（九）林可黴素Lincomycin

化學名：Methyl 6,8-dideoxy-6 [[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl) carbonyl] amino]-1-thio-d-erythro- α -d-galac-to-octopyranoside.

性狀：為鹽基性抗生素，通常以鹽酸鹽之一水合物供製劑用。鹽酸鹽為白

水、乙醇、甲醇、丙酮，可溶於乙酸乙酯，微溶於氯仿、乙醚，難溶或不溶於石油醚、甲苯等。本劑相當安定。

作用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、鈎端螺旋體屬及黴漿體有抗菌作用，對革蘭陰性桿菌則無抗菌作用。與其他巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。魚病上主要使用於鏈球菌之感染。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Kitasamycin。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目	經口	80mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
鱸形目	經口	80mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20

（八）林可黴素Lincomycin

化學名：Methyl 6,8-dideoxy-6 [[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl) carbonyl] amino]-1-thio-d-erythro- α -d-galac-to-octopyranoside.

性狀：為鹽基性抗生素，通常以鹽酸鹽之一水合物供製劑用。鹽酸鹽為白色結晶性粉末，無臭帶苦味。易溶於水，可溶於甲醇及乙醇，微溶或不溶於低極性有機溶劑。乾燥狀態或水溶液均相當安定。

作用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌有抗菌作用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。本劑與一部份巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。

注意事項：1、本劑不可與紅黴素同時使用。
2、本劑不可連續使用七日以上。
3、使用Lincomycin hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（海鱺除外）	經口	40mg／kg／日，連續使用 3～5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10

（九）歐索林酸Oxolinic acid

色結晶性粉末，無臭帶苦味。易溶於水，可溶於甲醇及乙醇，微溶或不溶於低極性有機溶劑。乾燥狀態或水溶液均相當安定。

作用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌有抗菌作用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。本劑與一部份巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。

注意事項：1、本劑不可與紅黴素同時使用。

2、本劑不可連續使用七日以上。

3、使用Lincomycin hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（海鱺除外）	經口	40mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10

（十）歐索林酸Oxolinic acid

化學名：5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo [4,5-g] quinoline-7-carboxylic acid

性狀：白色至帶白色柱狀結晶或結晶性粉末，無味，無臭。易溶於蟻酸，可溶於鹼性水，幾乎不溶於水及其他有機溶劑。

作用：對革蘭陰性菌有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、弧菌或發光桿菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Oxolinic acid或Sodium oxolinate monohydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鰻形目	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或鰻敗血症假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	25
	藥浴	5 ppm，連續藥浴3～5日。		
鮭形目（限鱒魚）	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌、鮭屬產氣單胞菌、親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	21
鮭形目（限香魚）	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光	14

化學名：5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo [4,5-g] quinoline-7-carboxylic acid

性狀：白色至帶白色柱狀結晶或結晶性粉末，無味，無臭。易溶於蟻酸，可溶於鹼性水，幾乎不溶於水及其他有機溶劑。

作用：對革蘭陰性菌有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、弧菌或發光桿菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Oxolinic acid或Sodium oxolinate monohydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鰻形目	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或鰻敗血症假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	25
	藥浴	5 ppm，連續藥浴3～5日。		
鮭形目（限鱒魚）	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌、鮭屬產氣單胞菌、親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	21
鮭形目（限香魚）	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	14
	藥浴	10 ppm，連續藥浴3～5日。		
鼠鱖目	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	14
鯉形目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鯰目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鱸形目（限吳郭魚）	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或發光桿菌之感染。	16

	藥浴	10 ppm，連續藥浴3～5日。	假單胞菌或弧菌之感染。	
鼠鱈目	經口	20mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	14
鯉形目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鮡目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鱸形目 (限吳郭魚)	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或發光桿菌之感染。	16
十足目	經口	50mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
無尾目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌或產黃色素菌屬之感染。	16
龜鱉目	經口	30mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	16

(十一) 羥四環黴素Oxytetracycline

化學名：4-(dimethylamino)-1, 4, 4a, 5, 5a, 6, 11, 12a-octahydro-3, 5, 6, 10, 12, 12a-hexahydroxy- 6-methyl-1, 11, dioxo-2-naphthacene carboxamide

性狀：為兩性物質，易與陽離子及陰離子結合形成鹽類。以鹽酸鹽，基質及鈣鹽供為製造製劑的原料。基質為金黃色結晶，易溶於酸及鹼，難溶於丙酮、乙醚、氯仿。鹽酸鹽亦為金黃色結晶、無臭、帶苦味，易溶於水、甲醇、乙醇、丙酮、丙二醇，可溶於丁醇，不溶於石油醚、乙醚及苯。易與金屬離子形成螯合物，影響腸道之吸收。魚病治療時通常使用鹽酸鹽。

作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、鈎端螺旋體屬

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期(日)
鰻形目	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或或愛德華氏菌之感染。	30
鼠鱈目	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
鱸形目	經口	50mg/kg/日，連	治療對本劑具有感受性親	30

、立克次體屬及大型病毒有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌或弧菌感染之治療。本劑與其他四環黴素類抗生素間有完全交叉抗藥性。				
注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。				
2、使用Oxytetracycline hydrochloride或Oxytetracycline quarternary salt。				
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鰻形目	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	30
鼠鱈目	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
鱸形目（吳郭魚、海鱷除外）	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
鱸形目（限吳郭魚）	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或法蘭西斯樣菌(劑量加倍)之感染。	20
鮭形目（限鱒魚）	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鮭屬產氣單胞菌或弧菌之感染。	30
十足目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
無尾目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30
龜鱉目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30

（吳郭魚、海鱷除外）		續使用3～5日。	水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	
鱸形目（限吳郭魚）	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或法蘭西斯樣菌(劑量加倍)之感染。	20
鮭形目（限鱒魚）	經口	50mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鮭屬產氣單胞菌或弧菌之感染。	30
十足目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
無尾目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30
龜鱉目	經口	50mg／kg／日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30

（十一）史黴素Spiramycin

化學名：Spiramycin embonate

性狀：白色～淡黃色之結晶性粉末，味苦。極易溶於氯仿或甲醇，易溶於丙酮，難溶於水。

作用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌具有抗菌性用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Spiramycin embonate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（海鱷除外）	經口	40mg／kg／日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30

（十二）磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine

化學名：N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide

性狀：白色結晶性粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於甲醇、乙醇，極難

(十二) 史黴素Spiramycin

化學名：Spiramycin embonate

性狀：白色～淡黃色之結晶性粉末，味苦。極易溶於氯仿或甲醇，易溶於丙酮，難溶於水。

作用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌具有抗菌性用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Spiramycin embonate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鱸形目（海鱺除外）	經口	40mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30

(十三) 磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine

化學名：N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide

性狀：白色結晶性粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於甲醇、乙醇，極難溶於氯仿，幾乎不溶於水、乙醚、苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氫試液。

作用：本劑對革蘭陽性菌及陰性菌有抗菌作用。屬於長效性磺胺劑。魚病上主要用於弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Sulfadimethoxine或Sulfadimethoxine sodium。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目（限鱒魚）	經口	100mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30

(十四) 磺胺一甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine

化學名：N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide or sodium salt

性狀：白色至微黃色結晶，微粒或粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於乙醇，極難溶於乙醚或氯仿，幾乎不溶於水或苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氫試液，遇光徐徐著色。藥浴時使用其鈉鹽。

作用：對革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性

溶於氯仿，幾乎不溶於水、乙醚、苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氫試液。

作用：本劑對革蘭陽性菌及陰性菌有抗菌作用。屬於長效性磺胺劑。魚病上主要用於弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Sulfadimethoxine或Sulfadimethoxine sodium。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鮭形目（限鱒魚）	經口	100mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30

(十三) 磺胺一甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine

化學名：N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide or sodium salt

性狀：白色至微黃色結晶，微粒或粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於乙醇，極難溶於乙醚或氯仿，幾乎不溶於水或苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氫試液，遇光徐徐著色。藥浴時使用其鈉鹽。

作用：對革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌或弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。本劑屬於長效性磺胺劑。

注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。

2、使用Sulfamonomethoxine或Sulfamonomethoxine sodium。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鰻形目	經口	第一日200mg/kg，翌日起改為半量，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	30
鱸形目（吳郭魚、海鱺除外）	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
鱸形目（限吳郭魚）	經口	第一日200mg/kg，翌日起改為半量	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光	15

產氣單胞菌、愛德華氏菌或弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。本劑屬於長效性磺胺劑。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Sulfamonomethoxine或Sulfamonomethoxine sodium。									
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
鰻形目	經口	第一日200mg/kg，翌日起改為半量，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	30	鮭形目（限鱒魚）	經口藥浴	150mg/kg/日，連續投藥3～5日。在1%食鹽水加本劑10 ppm。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30 15
鱸形目（吳郭魚、海鱺除外）	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30	鮭形目（限香魚）	經口	200mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
鱸形目（限吳郭魚）	經口	第一日200mg/kg，翌日起改為半量，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	15	無尾目	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
鮭形目（限鱒魚）	經口藥浴	150mg/kg/日，連續投藥3～5日。在1%食鹽水加本劑10 ppm。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30 15	龜鰲目	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
鮭形目（限香魚）	經口	200mg/kg/日，連續投藥3～5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30	（十四）甲磺氯徽素Thiamphenicol 化學名：D-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-P-(methylsulfonyl) phenethylacetamide 性狀：白色結晶性粉末，略有苦味，具有吸濕性，但對光及熱則相當安定。室溫在水中溶解度為0.5～1.0%，甲醇為5%，Dimethylformaldehyde及Propylene glycol的溶解度較高。 作用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於發光桿菌或弧菌感染之治療。 注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。 2、使用Thiamphenicol。				
無尾目	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30					
龜鰲目	經口	200mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30	對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期（日）
（十五）甲磺氯徽素Thiamphenicol 化學名：D-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-P-(methylsulfonyl) phenethylacetamide 性狀：白色結晶性粉末，略有苦味，具有吸濕性，但對光及熱則相當安定					鱸形目（吳郭魚、海鱺除外）	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或弧菌之感染。	15
					鱸形目（限吳郭魚）	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或弧菌之感染。	15
					（十五）三氯仿Trichlorfon				

。室溫在水中溶解度為0.5～1.0%，甲醇為5%，
Dimethylformaldehyde及Propylene glycol的溶解度較高。
作用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。
魚病上主要用於發光桿菌或弧菌感染之治療。
注意事項：1、本劑不可連續使用七日以上。
2、使用Thiamphenicol。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期(日)
鱸形目(吳郭魚、海鱺除外)	經口	50mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或弧菌之感染。	15
鱸形目(限吳郭魚)	經口	20mg/kg/日，連續使用3～5日。	治療對本劑具有感受性發光桿菌或弧菌之感染。	15

(十六) 三氯仿Trichlorfon

化學名：0,0-dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl phosphonate
性狀：白色結晶粉末，微有氣味，微溶於水、乙醚、氯仿及乙醇。
作用：低毒性廣效性殺蟲劑，魚病上主要用於體表或鰓之外寄生蟲。
注意事項：1、有些魚種或個體對本劑具敏感性，宜從較低濃度開始使用。
2、使用Trichlorofon。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期(日)
鰻形目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鼠鱈目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鯉形目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外	5

化學名：0,0-dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl phosphonate
性狀：白色結晶粉末，微有氣味，微溶於水、乙醚、氯仿及乙醇。
作用：低毒性廣效性殺蟲劑，魚病上主要用於體表或鰓之外寄生蟲。
注意事項：1、有些魚種或個體對本劑具敏感性，宜從較低濃度開始使用。
2、使用Trichlorofon。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期(日)
鰻形目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鼠鱈目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鯉形目	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鱸形目(吳郭魚除外)	藥浴	每次0.2～0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5

			寄生蟲。			
鱸形目(吳郭魚除外)	藥浴	每次0.2~0.5 ppm，每週一次，連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5		

動物用藥品使用準則第四條附件二含藥物飼料添加物使用規範修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。 (三) 卡巴得（Carbadox）製品，其卡巴得成分不得超過百分之十一。	一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。 (三) 卡巴得（Carbadox）製品，其卡巴得成分不得超過百分之十一。	本點未修正。
二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 培可黴素 Bicozamycin 1.4 恩黴素 Enramycin 1.5 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.6 六肽黴素 Nosiheptide 1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine 1.8 泰妙素 Tiamulin 1.9 泰黴素 Tylosin （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinate 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 歐美德普 Ormethoprim 2.13 沙利黴素 Salinomycin 2.14 仙杜拉素 Semduramicin 2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 2.17 柔林 Zoalene	二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 培可黴素 Bicozamycin 1.4 恩黴素 Enramycin 1.5 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.6 六肽黴素 Nosiheptide 1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine 1.8 泰妙素 Tiamulin 1.9 泰黴素 Tylosin （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinate 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 歐美德普 Ormethoprim 2.13 沙利黴素 Salinomycin 2.14 仙杜拉素 Semduramicin 2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 2.17 柔林 Zoalene	本點未修正。

三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					配合部分抗菌劑類、抗寄生蟲類及抗黴菌劑類品目業於九十四年至一百零四年七月一日間已刪除，併同移除使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項之文字後，配合調整項次。				
1.抗菌劑類					1.抗菌劑類									
本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。					本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。									
1.1 安痢黴素 Apramycin					1.1 安痢黴素 Apramycin									
化 學 名：Apramycin sulfate					化 學 名：Apramycin sulfate									
注意事項：連續使用不可超過 14 日。					注意事項：連續使用不可超過 14 日。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	
1.1.1 豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。		1.1.1 豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。						
1.2 阿美拉黴素 Avilamycin					1.2 阿美拉黴素 Avilamycin									
化 學 名：Avilamycin					化 學 名：Avilamycin									
注意事項：					注意事項：									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	
1.2.1 肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。		1.2.1 肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。						
1.2.2 豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		1.2.2 豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。						
	1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。			1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。						
1.3 培可黴素 Bicozamycin					1.3 培可黴素 Bicozamycin									
化 學 名：Bicozamycin					化 學 名：Bicozamycin									
注意事項：蛋雞不可使用。					注意事項：蛋雞不可使用。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	
1.3.1 雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。		1.3.1 雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。						
1.3.2 豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		1.3.2 豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。						
1.4 恩黴素 Enramycin					1.4 恩黴素 Enramycin									
化 學 名：Enramycin					化 學 名：Enramycin									

注意事項：					注意事項：									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		
1.4.1	雞（不包 括肉雞）	1.4.1.1	恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		1.4.1	雞（不包 括肉雞）	1.4.1.1	恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		
1.4.2	肉雞	1.4.2.1	恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。		1.4.2	肉雞	1.4.2.1	恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。		
1.4.3	豬	1.4.3.1	恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		1.4.3	豬	1.4.3.1	恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。		
1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin)					化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin		1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin)					化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin		
注意事項：							注意事項：							
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		
1.5.1	肉雞	1.5.1.1	富樂黴素	1-2.2	促進生長及改進飼料利用效率。		1.5.1	肉雞	1.5.1.1	富樂黴素	1-2.2	促進生長及改進飼料利用效率。		
1.5.2	豬	1.5.2.1	富樂黴素	2-4.4	與 1.5.1.1 相同。		1.5.2	豬	1.5.2.1	富樂黴素	2-4.4	與 1.8.1.1 相同。		
1.5.3	牛	1.5.3.1	富樂黴素	1-4.4	與 1.5.1.1 相同。		1.5.3	牛	1.5.3.1	富樂黴素	1-4.4	與 1.8.1.1 相同。		
1.6 六肽黴素 Nosiheptide					化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-ω][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiatriazacyclohexatriacontin-2-yl)-4- thiazole-carboxamide		1.6 六肽黴素 Nosiheptide					化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-ω][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiatriazacyclohexatriacontin-2-yl)-4- thiazole-carboxamide		
注意事項：							注意事項：							
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期		
1.6.1	雞（不包 括肉雞）	1.6.1.1	六肽黴素	2.5-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。		1.6.1	雞（不包 括肉雞）	1.6.1.1	六肽黴素	2.5-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。		
1.6.2	肉雞	1.6.2.1	六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥		1.6.2	肉雞	1.6.2.1	六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥		

加 磺胺二甲 嘧啶 44-110 制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎時，維持增重及飼料利用效率。停藥期15 日。					1.9.3.4 泰徽素 22-110 體重 10-30kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。																																																																																														
2.抗寄生蟲劑類 本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。					1.9.3.5 泰徽素 44-110 體重 60kg 以下使用，預防豬赤痢，控制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎時，維持增重及飼料利用效率。停藥期15 日。																																																																																														
2.1 安保寧 Amprolium 化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride 注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。					2.抗寄生蟲劑類 本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。																																																																																														
2.1 安保寧 Amprolium 化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride 注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。					2.1 安保寧 Amprolium 化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride 注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。																																																																																														
<table><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量（ppm）</th><th colspan="2">用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>2.1.1 肉雞</td><td>2.1.1.1 安保寧</td><td>80-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>新母雞</td><td>2.1.1.2 安保寧</td><td>40-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>蛋雞</td><td>2.1.1.3 安保寧</td><td>125</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>2.1.2 雞</td><td>2.1.2.1 安保寧</td><td>125-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td></td><td>加衣索巴</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.1.3 雞</td><td>2.1.3.1 安保寧</td><td>100</td><td colspan="2">預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。</td></tr><tr><td></td><td>加衣索巴</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>加磺胺奎林</td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr></table>					使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		2.1.1 肉雞	2.1.1.1 安保寧	80-250	預防球蟲病。		新母雞	2.1.1.2 安保寧	40-250	預防球蟲病。		蛋雞	2.1.1.3 安保寧	125	預防球蟲病。		2.1.2 雞	2.1.2.1 安保寧	125-250	預防球蟲病。			加衣索巴	4			2.1.3 雞	2.1.3.1 安保寧	100	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。			加衣索巴	5				加磺胺奎林	60			<table><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量（ppm）</th><th colspan="2">用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>2.1.1 肉雞</td><td>2.1.1.1 安保寧</td><td>80-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>新母雞</td><td>安保寧</td><td>40-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>蛋雞</td><td>安保寧</td><td>125</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td>2.1.2 雞</td><td>2.1.2.1 安保寧</td><td>125-250</td><td colspan="2">預防球蟲病。</td></tr><tr><td></td><td>加衣索巴</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.1.3 雞</td><td>2.1.3.1 安保寧</td><td>100</td><td colspan="2">預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。</td></tr><tr><td></td><td>加衣索巴</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>加磺胺奎林</td><td>60</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr></table>					使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		2.1.1 肉雞	2.1.1.1 安保寧	80-250	預防球蟲病。		新母雞	安保寧	40-250	預防球蟲病。		蛋雞	安保寧	125	預防球蟲病。		2.1.2 雞	2.1.2.1 安保寧	125-250	預防球蟲病。			加衣索巴	4			2.1.3 雞	2.1.3.1 安保寧	100	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。			加衣索巴	5				加磺胺奎林	60		
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期																																																																																																
2.1.1 肉雞	2.1.1.1 安保寧	80-250	預防球蟲病。																																																																																																
新母雞	2.1.1.2 安保寧	40-250	預防球蟲病。																																																																																																
蛋雞	2.1.1.3 安保寧	125	預防球蟲病。																																																																																																
2.1.2 雞	2.1.2.1 安保寧	125-250	預防球蟲病。																																																																																																
	加衣索巴	4																																																																																																	
2.1.3 雞	2.1.3.1 安保寧	100	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。																																																																																																
	加衣索巴	5																																																																																																	
	加磺胺奎林	60																																																																																																	
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期																																																																																																
2.1.1 肉雞	2.1.1.1 安保寧	80-250	預防球蟲病。																																																																																																
新母雞	安保寧	40-250	預防球蟲病。																																																																																																
蛋雞	安保寧	125	預防球蟲病。																																																																																																
2.1.2 雞	2.1.2.1 安保寧	125-250	預防球蟲病。																																																																																																
	加衣索巴	4																																																																																																	
2.1.3 雞	2.1.3.1 安保寧	100	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。																																																																																																
	加衣索巴	5																																																																																																	
	加磺胺奎林	60																																																																																																	
2.2 氯吡啶 Clopidol 化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。					2.2 氯吡啶 Clopidol 化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。																																																																																														
<table><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量（ppm）</th><th colspan="2">用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>2.2.1 肉雞及新母雞</td><td>2.2.1.1 氯吡啶</td><td>125-250</td><td colspan="2">預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。</td></tr></table>					使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		2.2.1 肉雞及新母雞	2.2.1.1 氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。		<table><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量（ppm）</th><th colspan="2">用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>2.2.1 肉雞</td><td>2.2.1.1 氯吡啶</td><td>125-250</td><td colspan="2">預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病</td></tr></table>					使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		2.2.1 肉雞	2.2.1.1 氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病																																																																							
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期																																																																																																
2.2.1 肉雞及新母雞	2.2.1.1 氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。																																																																																																
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期																																																																																																
2.2.1 肉雞	2.2.1.1 氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病																																																																																																

2.3 賽滅淨 Cyromazine 化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 注意事項：肉雞不可使用。					及新 母雞，停藥期 5 日。				
					2.3 賽滅淨 Cyromazine 化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 注意事項：肉雞不可使用。				
2.3.1	蛋雞及種雞	2.3.1.1	賽滅淨	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用 4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼蠅棲群增加時可重複使用。				
2.4 滴克奎諾 Decoquinate 化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate 注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。					2.3.1 蛋雞及種雞				
					2.4 滴克奎諾 Decoquinate 化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate 注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。				
2.4.1	肉雞	2.4.1.1	滴克奎諾	30	預防球蟲病。				
2.5 戴克拉爾 Diclazuril 化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile 注意事項：蛋雞不可使用。					2.4.1 肉雞				
					2.5 戴克拉爾 Diclazuril 化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile 注意事項：蛋雞不可使用。				
2.5.1	肉雞	2.5.1.1	戴克拉爾	1	預防球蟲病，停藥期 5 日				
2.6 衣索巴 Ethopabate 化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate 注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。					2.5.1 肉雞				
2.7 拉薩羅 Lasalocid 化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					2.6 衣索巴 Ethopabate 化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate 注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。				
					2.7 拉薩羅 Lasalocid 化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。				
2.7.1	肉雞或更	2.7.1.1	拉薩羅	75-125	預防球蟲病。				

新母雞					對 象 物 (ppm)				
2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。					2.7.1 肉雞 2.7.1.1 拉薩羅 75-125 預防球蟲病。 或更 新母 雞				
2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 及 Furazolidone 三者不可同時使用。					2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 及 Furazolidone 三者不可同時使用。				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.8.1	肉雞	2.8.1.1	馬杜拉黴素	5-7	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
		2.8.1.2	馬杜拉黴素	3.75-4.125	與 2.8.1.1 相同。				
			加						
			乃卡巴精	40-44					
2.9 孟寧素 Monensin 化 學 名：Monensin sodium 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.16 週齡以上之雞不可使用。 3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 4.馬或馬屬動物不可使用。					2.9 孟寧素 Monensin 化 學 名：Monensin sodium 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.16 週齡以上之雞不可使用。 3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 4.馬或馬屬動物不可使用。				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.9.1	雞	2.9.1.1	孟寧素	100-120	預防球蟲病。				
2.10 那寧素 Narasin 化 學 名：Narasin 注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。 2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。 3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。					2.9 孟寧素 Monensin 化 學 名：Monensin sodium 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.16 週齡以上之雞不可使用。 3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 4.馬或馬屬動物不可使用。				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.10.1	雞	2.10.1.1	那寧素	60-80	預防球蟲病。				
		2.10.1.2	那寧素	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
			加						
			乃卡巴精	30-50					
2.11 乃卡巴精 Nicarbazin					2.9 孟寧素 Monensin 化 學 名：Monensin sodium 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.16 週齡以上之雞不可使用。 3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 4.馬或馬屬動物不可使用。				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.9.1	雞	2.9.1.1	孟寧素	100-120	預防球蟲病。				
2.10 那寧素 Narasin 化 學 名：Narasin 注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。 2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。 3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。					2.10 那寧素 Narasin 化 學 名：Narasin 注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。 2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。 3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.10.1	雞	2.10.1.1	那寧素	60-80	預防球蟲病。				
		2.10.1.2	那寧素	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。				

化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					加 乃卡巴精 30-50				
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.11.1 雞	2.11.1.1	乃卡巴精		100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
	2.11.1.2	乃卡巴精		100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
		加 衣索巴		4-8					
2.12 歐美德普 Ormethoprim 化 學 名：2,4-Diamino-5- (6-methylveratryl)pyridine 注意事項：參照磺胺二甲氧嘧啶（2.15.1.1）合併使用，不可單獨使用。									
2.13 沙利黴素 Salinomycin 化 學 名：Sodium salinomycin 注意事項：1.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 2.產蛋中之蛋雞不可使用。									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.13.1 雞(不包 括肉 雞)	2.13.1.1	沙利黴素		50-70	使用至 10 週齡，預防球蟲病。				
	2.13.2 肉雞	2.13.2.1	沙利黴素	50-70	預防球蟲病。				
2.14 仙杜拉素 Semduramicin 化 學 名：Semduramicin salt sodium 注意事項：產蛋雞不可使用									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.14.1 肉雞	2.14.1.1	仙杜拉素		25	預防球蟲病。				
2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 化 學 名：N (2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) -sulfanilamide 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				

2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.11.1 雞	2.11.1.1	乃卡巴精		100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
	2.11.1.2	乃卡巴精		100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。				
		加 衣索巴		4-8					
2.12 歐美德普 Ormethoprim 化 學 名：2,4-Diamino-5- (6-methylveratryl)pyridine 注意事項：參照磺胺二甲氧嘧啶（2.15.1.1）合併使用，不可單獨使用。									
2.13 沙利黴素 Salinomycin 化 學 名：Sodium salinomycin 注意事項：1.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 2.與洛克沙生合併使用時只可使用於肉雞，不可使用於成火雞、馬或馬屬動物。 3.產蛋中之蛋雞不可使用。									
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期				
2.13.1 雞(不包 括肉 雞)	2.13.1.1	沙利黴素		50-70	使用至 10 週齡，預防球蟲病。				
	2.13.2 肉雞	2.13.2.1	沙利黴素	50-70	預防球蟲病。				
		2.13.2.2	沙利黴素	50-70	預防球蟲病，改進飼料利用效率，停藥期 5 日。				
		加 洛克沙生		25-50					
2.14 仙杜拉素 Semduramicin 化 學 名：Semduramicin salt sodium 注意事項：產蛋雞不可使用									

)					使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.15.1	肉雞及新母雞	2.15.1.1	磺胺二甲氧嘧啶加歐美德普	125 75	預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 化 學 名：2-Sulfanilaminoquinoxaline 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 化 學 名：N (2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) -sulfanilamide 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。			
	使用對象		飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期			
2.16.1	雞	2.16.1.1	磺胺奎林	150-250	預防球蟲病，停藥期 10 日。			
2.17 柔林 Zoalene 化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。					2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 化 學 名：2-Sulfanilaminoquinoxaline 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。			
	使用對象		飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期			
2.17.1	雞	2.17.1.1	柔林	40-125	預防球蟲病。			
					2.16.1 雞 2.16.1.1 磺胺奎林 150-250 預防球蟲病，停藥期 10 日。			
					2.17 柔林 Zoalene 化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。			
	使用對象		飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期			
2.17.1	雞	2.17.1.1	柔林	40-125	預防球蟲病。			
					四、待美密唑（Dimetridazole）、歐來金得（Olaquinox）、洛克沙生（Roxarsone）之使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下，並自中華民國一百零四年七月一日起不得添加於飼料： 1.1 待美密唑 Dimetridazole 化 學 名：1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole 注意事項：			
					一、 <u>本點刪除</u> 。 二、待美密唑（Dimetridazole）、歐來金得（Olaquinox）及洛克沙生（Roxarsone）等三種動物用藥品已自中華民國一百零四年七月一日起由含藥物飼料添加物品目中刪除，爰予刪			

	<table><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量 (ppm)</th><th>用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>1.1.1 豬</td><td>1.1.1.1 待美嘮唑</td><td>100-200</td><td>體重 60kg 以下使用，促進生長、改進飼料利用效率及控制豬赤痢，停藥期 28 日。</td></tr><tr><td colspan="4">1.2 歐來金得 Olaquinox 化 學 名：N-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-2-quinoxalinecarboxamide 1,4-dioxide 注意事項：</td></tr><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量 (ppm)</th><th>用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>1.2.1 豬</td><td>1.2.1.1 歐來金得</td><td>15-50</td><td>體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。</td></tr><tr><td></td><td>1.2.1.2 歐來金得</td><td>50-100</td><td>體重 30kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。</td></tr><tr><td colspan="4">1.3 洛克沙生 Roxarsone 化 學 名：3-Nitro-4-hydroxyphenylarsonic acid 注意事項：過量使用或缺少供應飲水時，可能導致腿無力現象。</td></tr><tr><th>使用對象</th><th>飼料添加物</th><th>用量 (ppm)</th><th>用途用法及停藥期</th></tr><tr><td>1.3.1 雞</td><td>1.3.1.1 洛克沙生</td><td>25-50</td><td>促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。</td></tr><tr><td>1.3.2 豬</td><td>1.3.2.1 洛克沙生</td><td>25-37.5</td><td>促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。</td></tr><tr><td></td><td>1.3.2.2 洛克沙生</td><td>200</td><td>控制豬赤痢，只可使用 5-6 日，使用期間應充分供應飲水，停藥期 5 日。</td></tr></table>	使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	1.1.1 豬	1.1.1.1 待美嘮唑	100-200	體重 60kg 以下使用，促進生長、改進飼料利用效率及控制豬赤痢，停藥期 28 日。	1.2 歐來金得 Olaquinox 化 學 名：N-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-2-quinoxalinecarboxamide 1,4-dioxide 注意事項：				使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	1.2.1 豬	1.2.1.1 歐來金得	15-50	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。		1.2.1.2 歐來金得	50-100	體重 30kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。	1.3 洛克沙生 Roxarsone 化 學 名：3-Nitro-4-hydroxyphenylarsonic acid 注意事項：過量使用或缺少供應飲水時，可能導致腿無力現象。				使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	1.3.1 雞	1.3.1.1 洛克沙生	25-50	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。	1.3.2 豬	1.3.2.1 洛克沙生	25-37.5	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。		1.3.2.2 洛克沙生	200	控制豬赤痢，只可使用 5-6 日，使用期間應充分供應飲水，停藥期 5 日。	除。
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期																																											
1.1.1 豬	1.1.1.1 待美嘮唑	100-200	體重 60kg 以下使用，促進生長、改進飼料利用效率及控制豬赤痢，停藥期 28 日。																																											
1.2 歐來金得 Olaquinox 化 學 名：N-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-2-quinoxalinecarboxamide 1,4-dioxide 注意事項：																																														
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期																																											
1.2.1 豬	1.2.1.1 歐來金得	15-50	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。																																											
	1.2.1.2 歐來金得	50-100	體重 30kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，預防控制豬赤痢，停藥期 28 日。																																											
1.3 洛克沙生 Roxarsone 化 學 名：3-Nitro-4-hydroxyphenylarsonic acid 注意事項：過量使用或缺少供應飲水時，可能導致腿無力現象。																																														
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期																																											
1.3.1 雞	1.3.1.1 洛克沙生	25-50	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。																																											
1.3.2 豬	1.3.2.1 洛克沙生	25-37.5	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。																																											
	1.3.2.2 洛克沙生	200	控制豬赤痢，只可使用 5-6 日，使用期間應充分供應飲水，停藥期 5 日。																																											
<u>四</u>、胺苯亞砷酸（Arsanilic acid）、卡巴得（Carbadox）之使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下，並自中華民國一百零五年七月一日起不得添加於飼料： 1.1 胺苯亞砷酸 Arsanilic acid 化 學 名：p-Aminobenzene arsonic acid 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。	<u>五</u>、胺苯亞砷酸（Arsanilic acid）、卡巴得（Carbadox）之使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下，並自中華民國一百零五年七月一日起不得添加於飼料： 1.1 胺苯亞砷酸 Arsanilic acid 化 學 名：p-Aminobenzene arsonic acid 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。	點次變更。																																												

使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)		用途用法及停藥期	
1.1.1	雞	1.1.1.1	胺苯亞砷酸	100	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。		
1.1.2	豬	1.1.2.1	胺苯亞砷酸	50-100	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。		
		1.1.2.2	胺苯亞砷酸	100	控制豬赤痢，使用 5-6 日，停藥期 5 日。		
1.2 卡巴得 Carbadox 化 學 名：Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate-N ¹ , N ⁴ -dioxide 注意事項：懷孕豬或種豬不可使用。							
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)		用途用法及停藥期	
1.2.1	豬	1.2.1.1	卡巴得	11-28	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 28 日。		
		1.2.1.2	卡巴得	50-55	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 28 日。		
		1.2.1.3	卡巴得加磺胺二甲嘧啶	50-55 100-110	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，於罹患萎縮性鼻炎時維持正常體重，停藥期 28 日。		

使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)		用途用法及停藥期	
1.1.1	雞	1.1.1.1	胺苯亞砷酸	100	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。		
1.1.2	豬	1.1.2.1	胺苯亞砷酸	50-100	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 5 日。		
		1.1.2.2	胺苯亞砷酸	100	控制豬赤痢，使用 5-6 日，停藥期 5 日。		
1.2 卡巴得 Carbadox 化 學 名：Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate-N ¹ , N ⁴ -dioxide 注意事項：懷孕豬或種豬不可使用。							
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)		用途用法及停藥期	
1.2.1	豬	1.2.1.1	卡巴得	11-28	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 28 日。		
		1.2.1.2	卡巴得	50-55	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 28 日。		
		1.2.1.3	卡巴得加磺胺二甲嘧啶	50-55 100-110	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，於罹患萎縮性鼻炎時維持正常體重，停藥期 28 日。		