

動物用藥品使用準則第四條附件二含藥物飼料添加物使用規範修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。	一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。 <u>(三) 卡巴得（Carbadox）製品，其卡巴得成分不得超過百分之十一。</u>	卡巴得（Carbadox）已自中華民國一百零五年七月一日起由含藥物飼料添加物品目中刪除，爰刪除卡巴得之成分規格。
二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 培可黴素 Bicozamycin 1.4 恩黴素 Enramycin 1.5 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.6 六肽黴素 Nosiheptide 1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine 1.8 泰妙素 Tiamulin 1.9 泰黴素 Tylosin （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinate 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 歐美德普 Ormethoprim 2.13 沙利黴素 Salinomycin 2.14 仙杜拉素 Semduramicin 2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 2.17 柔林 Zoalene	二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 培可黴素 Bicozamycin 1.4 恩黴素 Enramycin 1.5 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.6 六肽黴素 Nosiheptide 1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine 1.8 泰妙素 Tiamulin 1.9 泰黴素 Tylosin （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinate 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 歐美德普 Ormethoprim 2.13 沙利黴素 Salinomycin 2.14 仙杜拉素 Semduramicin 2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 2.17 柔林 Zoalene	本點未修正。

三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					一、卡巴得（Carbadox）已自中華民國一百零五年七月一日起由含藥物飼料添加物品目中刪除，爰修正 1.7 磺胺二甲嘧啶（Sulfamethazine）注意事項之文字。				
1.抗菌劑類					1.抗菌劑類					二、1.8.1.1 泰妙素之用途用法及停藥期酌作文字修正。				
本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。					本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。									
1.1 安痢黴素 Apramycin					1.1 安痢黴素 Apramycin									
化 學 名：Apramycin sulfate					化 學 名：Apramycin sulfate									
注意事項：連續使用不可超過 14 日。					注意事項：連續使用不可超過 14 日。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期			使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期					
1.1.1 豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。			1.1.1 豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。					
1.2 阿美拉黴素 Avilamycin					1.2 阿美拉黴素 Avilamycin									
化 學 名：Avilamycin					化 學 名：Avilamycin									
注意事項：					注意事項：									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期			使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期					
1.2.1 肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。			1.2.1 肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。					
1.2.2 豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。			1.2.2 豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
	1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。				1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
1.3 培可黴素 Bicozamycin					1.3 培可黴素 Bicozamycin									
化 學 名：Bicozamycin					化 學 名：Bicozamycin									
注意事項：蛋雞不可使用。					注意事項：蛋雞不可使用。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期			使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期					
1.3.1 雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。			1.3.1 雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。					
1.3.2 豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。			1.3.2 豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
1.4 恩黴素 Enramycin					1.4 恩黴素 Enramycin									
化 學 名：Enramycin					化 學 名：Enramycin									
注意事項：					注意事項：									
使用對象	飼料添加物	用量	用途用法及停藥期			使用對象	飼料添加物	用量	用途用法及停藥期					

對象物 (ppm)					對象物 (ppm)						
1.4.1	雞 (不包 括肉 雞)	1.4.1.1	恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。	1.4.1	雞 (不包 括肉 雞)	1.4.1.1	恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。
1.4.2	肉雞	1.4.2.1	恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。	1.4.2	肉雞	1.4.2.1	恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。
1.4.3	豬	1.4.3.1	恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。	1.4.3	豬	1.4.3.1	恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。
1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin) 化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin 注意事項：					1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin) 化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin 注意事項：						
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期	使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.5.1	肉雞	1.5.1.1	富樂黴素	1-2.2	促進生長及改進飼料利用效率。	1.5.1	肉雞	1.5.1.1	富樂黴素	1-2.2	促進生長及改進飼料利用效率。
1.5.2	豬	1.5.2.1	富樂黴素	2-4.4	與 1.5.1.1 相同。	1.5.2	豬	1.5.2.1	富樂黴素	2-4.4	與 1.5.1.1 相同。
1.5.3	牛	1.5.3.1	富樂黴素	1-4.4	與 1.5.1.1 相同。	1.5.3	牛	1.5.3.1	富樂黴素	1-4.4	與 1.5.1.1 相同。
1.6 六肽黴素 Nosiheptide 化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-ω][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiazacyclohexatriacontin-2- yl)-4- thiazole-carboxamide 注意事項：					1.6 六肽黴素 Nosiheptide 化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-ω][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiazacyclohexatriacontin-2- yl)-4- thiazole-carboxamide 注意事項：						
使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期	使用對象		飼料添加物		用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.6.1	雞 (不包 括肉 雞)	1.6.1.1	六肽黴素	2.5-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。	1.6.1	雞 (不包 括肉 雞)	1.6.1.1	六肽黴素	2.5-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。
1.6.2	肉雞	1.6.2.1	六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。	1.6.2	肉雞	1.6.2.1	六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。
1.6.3	豬	1.6.3.1	六肽黴素	2.5-20	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。	1.6.3	豬	1.6.3.1	六肽黴素	2.5-20	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。

1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine					
化 學 名：N ¹ -(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl) sulfanilamide					
注意事項：參照泰徽素（1.9.3.5）合併使用，不可單獨使用。					
1.8 泰妙素 Tiamulin					
化 學 名：14-Desoxy-14-[(2-diethylaminoethyl) mercaptoacetoxy] mutilin hydrogen fumarate					
注意事項：1.不可使用於體重超過 114 公斤（250 磅）的豬隻。					
2.不可與離子型球蟲藥（如 Monensin、Narasin 及 Salinomycin 等）合併使用。					
3.豬以外動物不可使用。					
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期
1.8.1	豬	1.8.1.1	泰妙素	11	促進生長及改進飼料利用效率。
		1.8.1.2	泰妙素	22-38.5	控制豬赤痢，停藥期 2 日。
1.9 泰徽素 Tylosin					
化 學 名：Tylosin phosphate					
注意事項：					
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期
1.9.1	雞	1.9.1.1	泰徽素	4.4-55	促進生長及改進飼料利用效率。
1.9.2	蛋雞	1.9.2.1	泰徽素	22-55	改進飼料利用效率。
1.9.3	豬	1.9.3.1	泰徽素	100-110	預防豬赤痢，100-110ppm 連續餵飼
				44	3 週後，改用 44ppm 至出售。
		1.9.3.2	泰徽素	11-22	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.3	泰徽素	22-44	體重 30-60kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.4	泰徽素	22-110	體重 10-30kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.5	泰徽素	44-110	體重 60kg 以下使用，預防豬赤痢，
		加		控制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎	
		磺胺二甲	44-110	時，維持增重及飼料利用效率。停藥	
		嘧啶		期 15 日。	
2.抗寄生蟲劑類					
本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料					

1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine					
化 學 名：N ¹ -(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl) sulfanilamide					
注意事項：參照卡巴得（第四點 1.2.1.3）及泰徽素（1.9.3.5）合併使用，不可單獨使用。					
1.8 泰妙素 Tiamulin					
化 學 名：14-Desoxy-14-[(2-diethylaminoethyl) mercaptoacetoxy] mutilin hydrogen fumarate					
注意事項：1.不可使用於體重超過 114 公斤（250 磅）的豬隻。					
2.不可與離子型球蟲藥（如 Monensin、Narasin 及 Salinomycin 等）合併使用。					
3.豬以外動物不可使用。					
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期
1.8.1	豬	1.8.1.1	泰妙素	11	促進生長及提高飼料利用效率。
		1.8.1.2	泰妙素	22-38.5	控制豬赤痢，停藥期 2 日。
1.9 泰徽素 Tylosin					
化 學 名：Tylosin phosphate					
注意事項：					
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期
1.9.1	雞	1.9.1.1	泰徽素	4.4-55	促進生長及改進飼料利用效率。
1.9.2	蛋雞	1.9.2.1	泰徽素	22-55	改進飼料利用效率。
1.9.3	豬	1.9.3.1	泰徽素	100-110	預防豬赤痢，100-110ppm 連續餵飼 3
				44	週後，改用 44ppm 至出售。
		1.9.3.2	泰徽素	11-22	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.3	泰徽素	22-44	體重 30-60kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.4	泰徽素	22-110	體重 10-30kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。
		1.9.3.5	泰徽素	44-110	體重 60kg 以下使用，預防豬赤痢，
		加		控制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎	
		磺胺二甲	44-110	時，維持增重及飼料利用效率。停藥	
		嘧啶		期 15 日。	
2.抗寄生蟲劑類					

添加物合併使用。						本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。					
2.1 安保寧 Amprolium						2.1 安保寧 Amprolium					
化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride						化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride					
注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。						注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。					
	使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.1.1	肉雞	2.1.1.1	安保寧	80-250	預防球蟲病。	2.1.1	肉雞	2.1.1.1	安保寧	80-250	預防球蟲病。
	新母雞	2.1.1.2	安保寧	40-250	預防球蟲病。		新母雞	2.1.1.2	安保寧	40-250	預防球蟲病。
	蛋雞	2.1.1.3	安保寧	125	預防球蟲病。		蛋雞	2.1.1.3	安保寧	125	預防球蟲病。
2.1.2	雞	2.1.2.1	安保寧加衣索巴	125-2504	預防球蟲病。	2.1.2	雞	2.1.2.1	安保寧加衣索巴	125-2504	預防球蟲病。
2.1.3	雞	2.1.3.1	安保寧加衣索巴加磺胺奎林	100560	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。	2.1.3	雞	2.1.3.1	安保寧加衣索巴加磺胺奎林	100560	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。
2.2 氯吡啶 Clopidol						2.2 氯吡啶 Clopidol					
化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol						化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol					
注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。						注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。					
	使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.2.1	肉雞及新母雞	2.2.1.1	氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。	2.2.1	肉雞及新母雞	2.2.1.1	氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。
2.3 賽滅淨 Cyromazine						2.3 賽滅淨 Cyromazine					
化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine						化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine					
注意事項：肉雞不可使用。						注意事項：肉雞不可使用。					
	使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象		飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.3.1	蛋雞及種	2.3.1.1	賽滅淨	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用 4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼	2.3.1	蛋雞	2.3.1.1	賽滅淨	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用

雞					及種 雞					4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼 蠅棲群增加時可重複使用。							
2.4 滴克奎諾 Decoquinate										2.4 滴克奎諾 Decoquinate							
化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate										化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate							
注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。										注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。							
使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期			使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期		
2.4.1	肉雞	2.4.1.1	滴克奎諾	30	預防球蟲病。												
2.5 戴克拉爾 Diclazuril										2.5 戴克拉爾 Diclazuril							
化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile										化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile							
注意事項：蛋雞不可使用。										注意事項：蛋雞不可使用。							
使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期			使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期		
2.5.1	肉雞	2.5.1.1	戴克拉爾	1	預防球蟲病，停藥期 5 日												
2.6 衣索巴 Ethopabate										2.6 衣索巴 Ethopabate							
化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate										化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate							
注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。										注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。							
2.7 拉薩羅 Lasalocid										2.7 拉薩羅 Lasalocid							
化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt										化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt							
注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。										注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。							
使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期			使用 對象		飼料添加 物		用 量 (ppm)		用途用法及停藥期		
2.7.1	肉雞	2.7.1.1	拉薩羅	75-125	預防球蟲病。												
	或更 新母 雞																
2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin										2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin							
化 學 名：Maduramicin ammonium										化 學 名：Maduramicin ammonium							
注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。										注意事項：1.蛋雞不可使用。							

3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。					2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。					3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.8.1	肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素	5-7	預防球蟲病，停藥期 5 日。	2.8.1	肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素	5-7	預防球蟲病，停藥期 5 日。	2.8.1	肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素	5-7	預防球蟲病，停藥期 5 日。
		2.8.1.2 馬杜拉黴素	3.75-4.125	與 2.8.1.1 相同。			2.8.1.2 馬杜拉黴素	3.75-4.125	與 2.8.1.1 相同。			2.8.1.2 馬杜拉黴素	3.75-4.125	與 2.8.1.1 相同。
		加					加					加		
		乃卡巴精	40-44				乃卡巴精	40-44				乃卡巴精	40-44	
2.9 孟寧素 Monensin					2.9 孟寧素 Monensin					2.9 孟寧素 Monensin				
化 學 名：Monensin sodium					化 學 名：Monensin sodium					化 學 名：Monensin sodium				
注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。					注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。					注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。				
2.16 週齡以上之雞不可使用。					2.16 週齡以上之雞不可使用。					2.16 週齡以上之雞不可使用。				
3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。					3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。					3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。				
4.馬或馬屬動物不可使用。					4.馬或馬屬動物不可使用。					4.馬或馬屬動物不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.9.1	雞	2.9.1.1 孟寧素	100-120	預防球蟲病。	2.9.1	雞	2.9.1.1 孟寧素	100-120	預防球蟲病。	2.9.1	雞	2.9.1.1 孟寧素	100-120	預防球蟲病。
2.10 那寧素 Narasin					2.10 那寧素 Narasin					2.10 那寧素 Narasin				
化 學 名：Narasin					化 學 名：Narasin					化 學 名：Narasin				
注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。					注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。					注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。				
2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。					2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。					2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。				
3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。					3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。					3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。				
	使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.10.1	雞	2.10.1.1 那寧素	60-80	預防球蟲病。	2.10.1	雞	2.10.1.1 那寧素	60-80	預防球蟲病。	2.10.1	雞	2.10.1.1 那寧素	60-80	預防球蟲病。
		2.10.1.2 那寧素	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。			2.10.1.2 那寧素	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。			2.10.1.2 那寧素	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。
		加					加					加		
		乃卡巴精	30-50				乃卡巴精	30-50				乃卡巴精	30-50	
2.11 乃卡巴精 Nicarbazin					2.11 乃卡巴精 Nicarbazin					2.11 乃卡巴精 Nicarbazin				
化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine					化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine					化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine				
注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.11.1	雞	2.11.1.1 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。	2.11.1	雞	2.11.1.1 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。	2.11.1	雞	2.11.1.1 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。
		2.11.1.2 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。			2.11.1.2 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。			2.11.1.2 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。

加 衣索巴 4-8				2.11.1.2 乃卡巴精 100-200 預防球蟲病，停藥期 5 日。 加 衣索巴 4-8			
2.12 歐美德普 Ormethoprim 化 學 名：2,4-Diamino-5- (6-methylveratryl)pyridine 注意事項：參照磺胺二甲氧嘧啶（2.15.1.1）合併使用，不可單獨使用。				2.12 歐美德普 Ormethoprim 化 學 名：2,4-Diamino-5- (6-methylveratryl)pyridine 注意事項：參照磺胺二甲氧嘧啶（2.15.1.1）合併使用，不可單獨使用。			
2.13 沙利黴素 Salinomycin 化 學 名：Sodium salinomycin 注意事項：1.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 2.產蛋中之蛋雞不可使用。				2.13 沙利黴素 Salinomycin 化 學 名：Sodium salinomycin 注意事項：1.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 2.產蛋中之蛋雞不可使用。			
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.13.1 雞(不包肉雞)	2.13.1.1 沙利黴素	50-70	使用至 10 週齡，預防球蟲病。	2.13.1 雞(不包肉雞)	2.13.1.1 沙利黴素	50-70	使用至 10 週齡，預防球蟲病。
2.13.2 肉雞	2.13.2.1 沙利黴素	50-70	預防球蟲病。	2.13.2 肉雞	2.13.2.1 沙利黴素	50-70	預防球蟲病。
2.14 仙杜拉素 Semduramicin 化 學 名：Semduramicin salt sodium 注意事項：產蛋雞不可使用				2.14 仙杜拉素 Semduramicin 化 學 名：Semduramicin salt sodium 注意事項：產蛋雞不可使用			
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.14.1 肉雞	2.14.1.1 仙杜拉素	25	預防球蟲病。	2.14.1 肉雞	2.14.1.1 仙杜拉素	25	預防球蟲病。
2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 化 學 名：N (2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) -sulfanilamide 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。				2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine 化 學 名：N (2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) -sulfanilamide 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。			
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.15.1 肉雞及新母雞	2.15.1.1 磺胺二甲氧嘧啶加歐美德普	125 75	預防球蟲病，停藥期 5 日。	2.15.1 肉雞及新母雞	2.15.1.1 磺胺二甲氧嘧啶加歐美德普	125 75	預防球蟲病，停藥期 5 日。
2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline 化 學 名：2-Sulfanilaminoquinoxaline				2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline			

注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					化 學 名：2-Sulfanilaminoquinoxaline 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。					
使用對象 飼料添加物 用量（ppm） 用途用法及停藥期					使用對象 飼料添加物 用量（ppm） 用途用法及停藥期					
2.16.1	雞	2.16.1.1	磺胺奎林	150-250	預防球蟲病，停藥期 10 日。					
2.17 柔林 Zoalene 化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。					2.17 柔林 Zoalene 化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。					
使用對象 飼料添加物 用量（ppm） 用途用法及停藥期					使用對象 飼料添加物 用量（ppm） 用途用法及停藥期					
2.17.1	雞	2.17.1.1	柔林	40-125	預防球蟲病。					

				進飼料利用效率，停藥期 28 日。	
	1.2.1.2	卡巴得	50-55	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 28 日。	
	1.2.1.3	卡巴得	50-55	體重 60kg 以下使用，預防控制豬赤痢及細菌性下痢，於罹患萎縮性鼻炎	
		加 磺胺二甲 嘧啶	100-110	時維持正常體重，停藥期 28 日。	